



108

nom vernaculaire	français	Raisinier bord de mer
	créole	Rézen bòdlanmé
	anglais	Sea grape
	espagnol	Uva de playa, uvero de playa, uva caleta (Cuba)
	allemand	Seetraube/Meertraubenbaum

origine	Antilles, côte est de l'Amérique centrale, côte nord-est de l'Amérique du Sud.
habitat	Présent dans toute la zone caraïbe, en bord de mer (littoral sec et sableux, altitude 0-200 mètres) Le raisinier bord-de-mer est particulièrement résistant au sel et à la sécheresse.
type	Le raisinier est un arbre au feuillage persistant, de 6 à 8 mètres de haut, souvent à plusieurs troncs ayant une écorce grise ou blanche.

Le raisinier ou raisinier « *Coccoloba uvifera* » est aussi appelé raisin marine.  
Son nom est dû à la ressemblance de ses fruits, à une grappe de raisins.



### fleur

Floraison en avril-mai.  
Les petites fleurs parfumées sont d'un blanc jaunâtre et disposées en longues inflorescences pendantes.  
Les fleurs femelles sont solitaires.  
Les fleurs mâles sont groupées jusqu'à 7.

### fructification

Septembre - octobre.



### fruit

Les fruits bacciformes (*en forme de baie*) sont verts puis violet-rouge à maturité. Ils sont réunis en grappes plus ou moins denses.



### utilisations

La pulpe du fruit est comestible et contient une graine unique.  
Le fruit est généralement consommé cru : il a une saveur agréable légèrement aigrelette.  
Il peut être également transformé en gelées ou rentrer dans la composition de boissons.